

Matematika I – přednáška 10

Shrnutí co bylo minule

Funkce, limita funkce.

Co bude dnes

Spojitosť reálných funkcí jedné reálné proměnné.

Tyto slidy najdete na adrese

<http://marian.fsik.cvut.cz/~valasek/teaching>

(pro osobní potřeby a nenahrazuje skripta ani přednášku).

Def nice (limita funkce). Předpokládejme, že $x_0 \in \mathbb{R}^*$ a že definiční obor funkce f obsahuje některé prstencové okolí $P(x_0)$ bodu x_0 . Platí-li pro každou posloupnost $\{x_n\}$ v $P(x_0)$ implikace

$$\lim x_n = x_0 \implies \lim f(x_n) = a ,$$

pak říkáme, že funkce f má v bodě x_0 **limitu** rovnou a . Píšeme: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$.

Poznámka. Skutečnost, že $\lim x_n = x_0$, se někdy také zkráceně zapisuje: $x_n \rightarrow x_0$. Podobně, místo $\lim f(x_n) = a$ můžeme krátce psát: $f(x_n) \rightarrow a$. Užijeme-li toto značení, můžeme implikaci v definici limity funkce psát takto:

$$x_n \rightarrow x_0 \implies f(x_n) \rightarrow a.$$

Při výpočtu hodnot konkrétních limit je důležitá tato věta:

Věta (o limitě součtu, rozdílu, součinu a podílu funkcí). *Nechť* $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ a

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$. *Pak platí:*

a) $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = a + b,$

b) $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = a - b,$

c) $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = a \cdot b,$

d) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b},$

pokud výrazy na pravých stranách mají smysl.

Velmi užitečné jsou také následující věty o limitách složených funkcí:

Věta (1. věta o limitě složené funkce). Nechť $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$ a nechť funkce f je spojitá v bodě λ . Pak platí: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(\lambda)$.

Věta (2. věta o limitě složené funkce). Nechť $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ (respektive $-\infty$). Nechť $\lim_{y \rightarrow \infty} f(y) = L$ (respektive $\lim_{y \rightarrow -\infty} f(y) = L$). Pak platí: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = L$.

Matematika I – přednáška 10

Shrnutí co bylo minule

Funkce, limita funkce.

Co bude dnes

Spojitosť reálných funkcí jedné reálné proměnné.

Tyto slidy najdete na adrese



<http://marian.fsik.cvut.cz/~valasek/teaching>

(pro osobní potřeby a nenahrazuje skripta ani přednášku).

Matematika I – přednáška 10

II.4. Spojitost funkce

Motivace. Jaký je rozdíl mezi funkcemi f a g ?



Definice. O funkci f říkáme, že je *spojitá v bodě* $x_0 \in D(f)$, jestliže

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Poznámka. Aby funkce f mohla být spojitá v bodě x_0 , musí být definovaná v nějakém okolí bodu x_0 .

Definice. O funkci f říkáme, že je *spojitá zprava v bodě* $x_0 \in D(f)$, jestliže


$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

Analogicky definujeme funkci *spojitou zleva v bodě* x_0 .

Poznámka. Z uvedených definic snadno plyne toto tvrzení: *Funkce f je spojitá v bodě x_0 právě tehdy, je-li v tomto bodě spojitá zprava i zleva.*

3 možnosti:



a) ~~f-ce je spojita~~




b) ~~f-ce ma' odstranitelnu nespojitosť~~

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

$$f^* = \begin{cases} f(x) & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$



c) ~~f-ce ma' neodstranitelnu nespojitosť~~



Definice. Nechť I je interval v \mathbb{R} s krajními body a a b , $a < b$. Říkáme, že funkce f je *spojitá v intervalu I* , jestliže

- a) f je spojitá v každém bodě $x \in (a, b)$,
- b) f je spojitá zprava v bodě a (pokud $a \in I$),
- c) f je spojitá zleva v bodě b (pokud $b \in I$).

Další obrázky a příklady: viz TABULE

Věta. *Polynomy, goniometrické funkce, cyklometrické funkce, mocninná funkce, exponenciální funkce a logaritmická funkce jsou spojité v každém intervalu, který je částí jejich definičního oboru.*

Věta (o spojitosti součtu, rozdílu, atd. v bodě x_0). *Jsou-li funkce f a g spojité v bodě x_0 , pak též funkce $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ a $|f|$ jsou spojité v bodě x_0 . Je-li navíc $g(x_0) \neq 0$, je i funkce f/g spojitá v bodě x_0 .*

Věta. Polynomy, goniometrické funkce, cyklometrické funkce, mocninná funkce, exponenciální funkce a logaritmická funkce jsou spojité v každém intervalu, který je částí jejich definičního oboru.

Věta (o spojitosti součtu, rozdílu, atd. v bodě x_0). Jsou-li funkce f a g spojité v bodě x_0 , pak též funkce $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ a $|f|$ jsou spojité v bodě x_0 . Je-li navíc $g(x_0) \neq 0$ je i funkce f/g spojitá v bodě x_0 .

Poznámka. Věta platí i tehdy, když „spojitost v bodě x_0 ” nahradíme „spojitostí zprava v bodě x_0 ”, případně „spojitostí zleva v bodě x_0 ”. V důsledku toho věta platí i tehdy, nahradíme-li „spojitost v bodě x_0 ” „spojitostí v intervalu I ”. (V tomto případě je třeba v poslední části věty předpokládat, že $g(x) \neq 0$ všechna $x \in I$.)

Věta (o spojitosti složené funkce v bodě x_0). Je-li funkce g spojitá v bodě x_0 a funkce f spojitá v bodě $g(x_0)$, pak složená funkce $f \circ g$ (tj. funkce $y = f(g(x))$) je spojitá v bodě x_0 .

Obdobné tvrzení lze dokázat i ohledně spojitosti složené funkce v intervalu:

Je-li funkce g spojitá v intervalu I , funkce f je spojitá v intervalu J a je-li $g(I) \subset J$, pak rovněž složená funkce $f \circ g$ je spojitá v intervalu I .

Věta (o spojitosti složené funkce v bodě x_0). Je-li funkce g spojitá v bodě x_0 a funkce f spojitá v bodě $g(x_0)$, pak složená funkce $f \circ g$ (tj. funkce $y = f(g(x))$) je spojitá v bodě x_0 .

Obdobné tvrzení lze dokázat i ohledně spojitosti složené funkce v intervalu:

Je-li funkce g spojitá v intervalu I , funkce f je spojitá v intervalu J a je-li $g(I) \subset J$, pak rovněž složená funkce $f \circ g$ je spojitá v intervalu I .

Některé důležité vlastnosti spojitých funkcí:

Věta (o nabývání mezíhodnot). Je-li funkce f spojitá v intervalu I a jsou-li x_1 a x_2 dva libovolné body z I , pak ke každému číslu η ležícímu mezi $f(x_1)$ a $f(x_2)$ existuje bod ξ ležící mezi x_1 a x_2 takový, že $f(\xi) = \eta$.

Věta (o spojitosti inverzní funkce). *Je-li funkce f spojitá a prostá v intervalu I , $f(I) = J$, pak inverzní funkce f^{-1} je spojitá v intervalu J .*

Definice (extrémy funkce). Říkáme, že funkce f nabývá v bodě $x_0 \in D(f)$ svého *maxima*, jestliže pro všechna $x \in D(f)$ platí: $f(x) \leq f(x_0)$. Píšeme $f(x_0) = \max f$.

Říkáme, že funkce f nabývá v bodě $x_0 \in D(f)$ svého *minima*, jestliže pro všechna $x \in D(f)$ platí: $f(x) \geq f(x_0)$. Píšeme $f(x_0) = \min f$.

Maximum a minimum funkce f nazýváme souhrně *extrémy* funkce f .

Definice (Supremum a infimum funkce). Supremum množiny hodnot funkce f ($H(f)$) nazýváme *supremem funkce* f . Píšeme $\sup f$.

Infimum množiny hodnot funkce f ($H(f)$) nazýváme *infimem funkce* f . Píšeme $\inf f$.

Pozn. Supremum množiny hodnot funkce f na množině M ($H(f|_M)$) nazýváme supremem funkce f na množině M . Píšeme $\sup_M f$.

Analogicky infimum funkce f na množině M .

Věta (o spojitosti inverzní funkce). Je-li funkce f spojitá a prostá v intervalu I , $f(I) = J$, pak inverzní funkce f_{-1} je spojitá v intervalu J .

Věta (o existenci maxima a minima). Nechť funkce f je spojitá v uzavřeném a omezeném intervalu $\langle a, b \rangle$. Pak extrémny $\max_{x \in \langle a, b \rangle} f(x)$ a $\min_{x \in \langle a, b \rangle} f(x)$ existují.