

## Matematika I – přednáška 9

### Shrnutí co bylo minule

Základní pojmy diferenciálního počtu. Posloupnosti reálných čísel.

### Co bude dnes

Limita funkce.

Tyto slidy jsou na adrese

<https://users.fs.cvut.cz/jan.valasek>  
(pro osobní potřeby a nenahrazuje skripta ani přednášku).

## Matematika I – přednáška 9

### Limita funkce

**Motivace.** Definičním oborem funkce  $f(x) = \sin x/x$  je množina  $\mathbb{R} - \{0\}$ . Tabulka hodnot této funkce v některých bodech  $x$ :

$x$	-1	-0.2	-0.05	-0.01	0.01	0.05	0.2	1
$f(x)$	0.84147	0.99335	0.99958	0.99998	0.99998	0.99958	0.99335	0.84147

Z tabulky lze usuzovat, že pro  $x$  „blížící se“ k nule se  $f(x)$  „blíží“ k jedné. Toto lze přesným způsobem vyjádřit užitím pojmu „limita funkce“.

**Definice (limita funkce).** Předpokládejme, že  $x_0 \in \mathbb{R}^*$  a že definiční obor funkce  $f$  obsahuje některé prstencové okolí  $P(x_0)$  bodu  $x_0$ . Platí-li pro každou posloupnost  $\{x_n\}$  v  $P(x_0)$  implikace

$$\left[ \lim x_n = x_0 \right] \implies \left[ \lim f(x_n) = a \right],$$

pak říkáme, že funkce  $f$  má v bodě  $x_0$  *limitu* rovnou  $a$ . Píšeme:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ .

$a \in \mathbb{R}$  ... vlastní limita

$a = \pm\infty$  ... nevlastní limita

$x_0 \in \mathbb{R}$  ... limita ve vlastním bodě

$x_0 = \pm\infty$  ... limita v nevlastním bodě


**Poznámka.** Existence a hodnota limity funkce  $f$  v bodě  $x_0$  jsou určeny výhradně chováním funkce  $f$  v okolí bodu  $x_0$ , nikoliv v bodě  $x_0$  samém.

**Věta.** Funkce  $f$  může mít v jakémkoliv bodě  $x_0 \in \mathbb{R}^*$  nejvýše jednu limitu.

Limita funkce  $f$  v bodě  $x_0$  může, ale nemusí existovat.

**Příklad.** Funkce  $f(x) = \operatorname{sgn} x$  nemá v bodě 0 limitu.

**Proč?**



**Věta.** Funkce  $f$  může mít v jakémkoliv bodě  $x_0 \in \mathbb{R}^*$  nejvýše jednu limitu.


Limita funkce  $f$  v bodě  $x_0$  může, ale nemusí existovat.

**Příklad.** Funkce  $f(x) = \operatorname{sgn} x$  nemá v bodě 0 limitu.

Zvolme  $x_n = (-1)^n/n$ . Pak  $x_n \rightarrow 0$ .

Platí:  $f(x_n) = \operatorname{sgn}[(-1)^n/n] = (-1)^n$ .

Limita  $\lim (-1)^n$  však neexistuje.



**Poznámka.** Skutečnost, že  $\lim x_n = x_0$ , se někdy také zkráceně zapisuje:  $x_n \rightarrow x_0$ . Podobně, místo  $\lim f(x_n) = a$  můžeme krátce psát:  $f(x_n) \rightarrow a$ . Užijeme-li toto značení, můžeme implikaci v definici limity funkce psát takto:

$$x_n \rightarrow x_0 \implies f(x_n) \rightarrow a.$$

Při výpočtu hodnot konkrétních limit je důležitá tato věta:

**Věta (o limitě součtu, rozdílu, součinu a podílu funkcí).** *Nechť*  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$  a

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$ . *Pak platí:*

a)  $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = a + b,$

b)  $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = a - b,$

c)  $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = a \cdot b,$

d)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b},$

*pokud výrazy na pravých stranách mají smysl.*

**Příklady:** 1)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{x + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - x^{-1}}{1 + 4x^{-1}} = \frac{\infty - 0}{1 + 0} = \infty$

2)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 1}{x + 4} = \frac{2^2 - 1}{2 + 4} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

**Další příklady:** viz TABULE

**Poznámka.** Lze ukázat, že je-li  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$  a  $g(x) > 0$  v nějakém prstencovém okolí  $P(x_0)$ , pak

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty.$$

Rozmyslete si sami případy, kdy  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$  a  $g(x) \leq 0$  v nějakém prstencovém okolí  $P(x_0)$ .

**Příklady.** 1)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x + 3}{(x - 1)^2} = \infty$       2)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{5x - 4}{(x + 2)^2} = -\infty$

**Definice (limita zprava).** Předpokládejme, že  $x_0 \in \mathbb{R}$  a že definiční obor funkce  $f$  obsahuje některé pravé okolí  $P_+(x_0)$  bodu  $x_0$ . Jestliže pro každou posloupnost  $\{x_n\}$  v  $P_+(x_0)$  platí implikace

$$\left[ \lim x_n = x_0 \right] \implies \left[ \lim f(x_n) = a \right],$$

pak říkáme, že funkce  $f$  má v bodě  $x_0$  *limitu zprava* rovnou  $a$ .

Píšeme:  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a$ .

Analogicky můžeme definovat *limitu zleva* funkce  $f$  v bodě  $x_0$ . Píšeme:  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a$ .

**Věta.** Funkce  $f$  má v bodě  $x_0 \in \mathbb{R}$  limitu rovnou  $a$  právě když má v bodě  $x_0$  limitu zprava i limitu zleva a obě jsou rovné  $a$ .



Velmi užitečné jsou také následující **věty o limitách složených funkcí**:

**Věta (1. věta o limitě složené funkce).** *Nechť  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lambda$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$  a nechť funkce  $f$  je spojitá v bodě  $\lambda$ . Pak platí:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(\lambda)$ .*

**Příklady:** viz TABULE

**Věta (2. věta o limitě složené funkce).** *Nechť  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$  (respektive  $-\infty$ ). Nechť  $\lim_{y \rightarrow \infty} f(y) = L$  (respektive  $\lim_{y \rightarrow -\infty} f(y) = L$ ). Pak platí:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = L$ .*

**Příklady:** viz TABULE